

Figure 1 : cartographie des résistances aux pyréthrinoides en Auvergne-Rhône-Alpes

mise à jour en juillet 2022 (Source : Terres Inovia).




Figure 2 : efficacités comparées du Boravi WG et du Karaté Zéon sept jours après application sur sept essais en l'absence de résistance SKDR




Figure 3 : efficacité comparée de différentes pyréthrinoides à trois-quatre jours et sept jours après application




Figure 4 : date moyenne d'atteinte du stade quatre feuilles du colza sur les dix dernières années en Auvergne-Rhône-Alpes selon la date de semis

Date de semis	Date d'atteinte du stade 4 feuilles					
	Étoile sur Rhône (Drôme)	Vichy (Allier)	Clermont Ferrand (Puy-de-Dôme)	Ambérieu (Ain)	Lyon Saint-Exupéry (Rhône)	Saint-Etienne de Saint-Geoirs (Isère)
15 août	4 septembre	6 septembre	6 septembre	6 septembre	5 septembre	6 septembre
20 août	9 septembre	13 septembre	11 septembre	12 septembre	10 septembre	11 septembre
25 août	15 septembre	19 septembre	17 septembre	18 septembre	16 septembre	19 septembre
30 août	21 septembre	25 septembre	25 septembre	24 septembre	22 septembre	25 septembre
5 septembre	27 septembre	30 septembre	30 septembre	30 septembre	29 septembre	2 octobre
10 septembre	3 octobre	7 octobre	6 octobre	6 octobre	3 octobre	8 octobre
15 septembre	11 octobre	17 octobre	16 octobre	17 octobre	13 octobre	17 octobre