

TABLEAU 2 / Exemple de stratégies de désherbage en variétés tolérantes aux herbicides

OU	Pulsar 40* 0,8 l/ha à 1 l/ha Davai* 0,4 l/ha Passat Plus 1,3 l/ha	Amarante, datura, linaira batarde, morelle, moutarde, ravenelle
OU	Pulsar 40* 1 l/ha Davai* 0,5 l/ha Pulsar 40 1,25 l/ha Davai 0,65 l/ha Passat Plus 1,6 l/ha	+ autres espèces (voir spectre)
	Passat Plus 2 l/ha	Bénéfices sur ambroisie, renouée liseron, tournesol sauvage, digitale, gaillet, laitron, mercuriale, seneçon
OU	2x Pulsar 40* 0,6l /ha 2x Davai* 0,32 l/ha 2x Passat Plus 1 l/ha	Bénéfices sur ambroisie, renouée liseron, tournesol sauvage, xanthium, ammi-majus, anthémis, helminthie, laitron, matricaire, mercuriale

Adaptation de la dose selon la flore (prélevée à adapter ; positionnement à 4 feuilles du tournesol)

* : Huile végétale type Actirob B. Stratégie en deux passages : stade 2-3 feuilles puis 8-10 jours plus tard.