

AMBROISIE / Les modes de gestion

Le tableau ci-dessous, établi par Arvalis-Institut du végétal, permet de déterminer le(s) mode(s) de gestion à adopter selon trois grands critères : présence ou absence d'ambroisie à la récolte, présence ou absence de vivaces sur la parcelle et couverture du sol après récolte.

Absence d'ambroisie à la récolte

Absence de vivaces	Sol nu	Déchaumage (faux semis et mélange terre - résidus)
	Couvert à semer	Déchaumage en bonnes conditions de sol, semis du couvert* et roulage
Présence de vivaces	Sol nu	Désherbage des vivaces après redémarrage (15 à 30 cm) puis déchaumage tardif (faux semis et mélange terre - résidus)
	Couvert à semer	Désherbage des vivaces après redémarrage (15 à 30 cm) puis après 7 jours minimum, déchaumage, semis du couvert et roulage

Présence d'ambroisie à la récolte

Absence de vivaces	Sol nu	Déchaumage avant floraison des ambrosies puis 2 ^e déchaumage éventuel si relevées d'adventices ou désherbage avant floraison puis déchaumage tardif (faux semis et mélange terre - résidus)
	Couvert à semer	Déchaumage avant floraison des ambrosies, semis du couvert* et roulage
Présence de vivaces	Sol nu	Déchaumage des vivaces après redémarrage (15 à 30 cm) mais avant floraison des ambrosies puis déchaumage tardif (faux semis et mélange terre - résidus)
	Couvert à semer	Désherbage des vivaces après redémarrage (15 à 30 cm) mais avant floraison des ambrosies puis déchaumage, semis du couvert et roulage

*Derrière colza, les repousses de colza remplacent le semis d'un couvert.